


ワンちゃんのワクチン接種 プログラム変更のお知らせ



当院では、これまで伝染病予防に対して9種同時に予防できる「キャナイン9」をすすめてきましたが、ワンちゃんへの副作用のリスクや負担を分散するという観点から、新たに「バンガード5/cv (6種)」と「バンガードL4 (4種)」を半年毎交互に接種（合計10種）するプログラムに変更致します。

基本的に混合ワクチンは、種類が増えるほどワンちゃんへの負担やリスクが高まります。しかし人間のように伝染病毎に分けて接種するのは面倒だなどの理由で、ワクチンの中身がどんどん増えてきました。つまり、ワンちゃんへの負担より、飼い主への負担を軽減させることを優先させてきたのです。

年に1回の接種を、半年ごとに分散させて交互に接種することでワンちゃんへの負担が軽減できます。



予防可能な効能・効果	5/CV	L4	キャナイン9
①犬ジステンパー	○		○
②犬伝染性肝炎	○		○
③犬アデノウィルス型感染症	○		○
④犬パラインフルエンザ	○		○
⑤犬パルボウィルス感染症	○		○
⑥犬コロナウィルス感染症	○		○
⑦犬レプトスピラ感染症ポモナ		○	
⑧犬レプトスピラ感染症カニコーラ	○	○	
⑨犬レプトスピラ感染症イクテロヘモラジー	○		
⑩犬レプトスピラ感染症グリッポチフォーサ	○		
⑪犬レプトスピラ感染症コペンハーゲニー		○	
⑫犬レプトスピラ感染症ヘブドマディス	○		

キャナイン9接種後半年以内のワンちゃん

前回接種から半年後にL4接種。その後半年ごとにL4と5/CVを交互に接種。

キャナイン9接種後半年～1年のワンちゃん

すぐにL4を接種。キャナイン9接種1年後に5/CVを接種。その後半年ごとにL4と5/CVを交互に接種。

キャナイン9接種後1年以上又は未接種のワンちゃん

すぐにL4と5/CVを接種。その後半年ごとにL4と5/CVを交互に接種。

子犬

生後63～84日のワンちゃんは、L4と5/CVを3週間間隔で2回交互に接種。その後半年ごとにL4と5/CVを交互に接種。生後84日～のワンちゃんは、L4と5/CVを接種。その後半年ごとにL4と5/CVを交互に接種。

身近なペットのホームドクター

中山どうぶつ病院